

Aktiva zoner för
olika behandlingar
med apparaten

BIOTREM UNIVERSAL



Områden för BiotrEM-åtgärder

Denna publikation presenterar en atlas över de biologiskt aktiva zoner som rekommenderas för användare av Biotrem Technology-apparater.


Zonerna har identifierats genom att sammanfatta de ackumulerade kliniska resultaten och har rekommenderats för användning eftersom de har starka harmoniserande effekter.

Dessa är de zoner där kroppen reagerar maximalt på effekterna av BioTrEM-tekniken. Varje zon kännetecknas av både allmänna och specifika effekter.

BioTrEM-behandlingsområdet är större än en biologiskt aktiv punkt på grund av teknikens speciella egenskaper. Dessutom är BioTrEM-teknologins särdrag sådant att det organ som lider mest kommer att svara på behandlingen med önskad effekt. Det är den lidande vävnaden som kommer att ge det största svaret på BioTrEM-teknologins enheter, inom dess fysiologiska kapacitet.

- Zonens yta för BiotrEM-effekten är 2-4 cm⁽²⁾.
- Nästan alla zoner är parade - de är placerade till vänster och höger om kroppscentrum. Om en zon är oparad är det markerat i beskrivningen.
- Zonerna används för att formulera terapeutiska och hälsofrämjande tekniker.

Materialet har ett referenssyfte.



Zon 1


Ligger vid basen av stortånageln.

Ansvarig för leverartären, portalsystemet¹, kärl- och lymfoid vävnad samt kvaliteten på nässlemhinnan (som är den första barriären i immunförsvaret).

Det används vid svullnad av nasofaryngeal slemhinna, inflammation i nasofarynx, med nedsatt mikrocirkulation i levern och hypoxi (syrebrist) i levern, med nedsatt funktion i portalsystemet, med nedsatt gallbildning.

Allmänna rekommendationer: försiktighet bör iakttagas, inflytande bör utnyttjas helst i bakgrunden.

Exponering för området ökar energin, så om det finns underliggande inflammatoriska processer kan de visa sig.



Zon 2


Ligger på fotens dorsala yta, framför metatarsofalangerna I och II av lederna.

Ansvarar för tillståndet hos hepatocyten (leverceller hos människor och djur), leverns kapillärsystem ("mirakelnätverk").

Det används för att öka leverfunktionen, för att kompensera för proteinförlust av njurarna, vid inflammation i urinblåsan (alla former av cystit), vid attacker av hjärklappning i samband med sköldkörtelpatologi.

Allmänna rekommendationer: det att information från qumocmomuco² om patienten tar den) "överförs" till detta område.

Exponering för denna zon ökar energin, men vid kroniska sjukdomstillstånd kan det ske en snabb uppgång och en djup nedgång, så det är att föredra att använda den i *bakgrunden*.



Zon 3

Belägen på den dorsala ytan av den mellersta tredjedelen av foten, mellan I och II med mina fingrar.


Ansvarar för leverns mikrosomala^H system, metaboliska processer i levern, leverns syntetiska och avgiftande funktioner, protrombinsyntes, interdollikala gallgångar, perifera nervsystemet, muskeltonus.

Det används för att normalisera metaboliska, energetiska och plastiska processer, för att säkerställa tillväxt och utveckling, för att eliminera spasmer, i akuta processer (när strukturell patologi är låg) och för att öka avgiftningen.

Zon 3 **rekommenderas** för fettleverdystrofi, för att eliminera gallstas (stas), för muskelspasmer, kramper, för att förhindra hypotoni (låg ton) i , för inflammatoriska hudsjukdomar, akne, neurodermatit, för att återställa funktionen hos glatta muskler (, urinledare, urinvägar, livmoder, prostata, sfinkter), reflux⁴, vid övervikt eller undervikt, vid hög trötthet, vid krampsyndrom, vid alla nervskador.

Det rekommenderas att använda zon 3 hos barn. Även om det inte finns några klagomål om barnets hälsa är det tillrådligt att påverka denna zon i bakgrundslägen, eftersom den är ansvarig plastprocesser. För ett barn är detta en hälsosam, vackert formad kropp.

+Zon 3 zon 13 - all rehabilitering efter immobilisering. +Zon 3 zon 28 för avlastning av venerna i de nedre extremiteterna.
+Zon 3 zon 33 - för polyneuropati, angiopati.



Zon 4


Ligger i utkanten av hamstringsvecken när knäleden är internt böjd.

Ansvarig för leverkapselns tillstånd, leverns bindväv, mikrocirkulationen i levern, för leverns syntetiska funktion, för tillståndet hos de perifera fibrerna i det parasympatiska nervsystemet, för morfologin i nasofaryngeal slemhinna.

Det används för att återställa celler i alla vävnader till reglerande påverkan, för att optimera receptorns känslighet för hormoner, för att harmonisera och optimera leverfunktionen, för att tonifiera det parasympatiska nervsystemet, för att optimera balansen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet, vid alla störningar av hormonell sexuell funktion, vid störningar av kolhydratmetabolism, vid av kolesterolmetabolism (kolesterolemi), för att förhindra kroniska patologiska processer (för bevarande av kolesterolemi), för att förhindra kroniska patologiska processer (för bevarande av kolesterolmetabolism).

Vid osteokondros, för behandling och förebyggande av hepatit och levercirros, polyper i näshålan, överväxt av lymfoid vävnad, atrofi av nässlemhinnan, atrofisk rinit, tonsillit, vid pankreatopati hos barn, vid leversjukdom vid hjärtsvikt, arbetspatologi, vid förgiftning, för förebyggande och kompensation av atrofi och dystrofi, om en person är kall vid normal temperatur (tas tillsammans med zon 80).

Exponering för denna zon ger optimal vävnadskänslighet för glukokortikoider (externa eller egna) - binjurehormoner som gör att vävnader kan överleva i avsaknad av glukos, i avsaknad av syre, ökar vävnadens motståndskraft mot det skadliga medlet, bevarar strukturen.




Zon 5

Det är i ljumskarna.

Ansvarar för tillståndet i manliga och kvinnliga könskörtlar, för syntesen av könshormoner.


Det används för alla störningar av hormonell sexuell funktion.



Zon 6

Den är belägen vid den nedre kanten av den fria änden av XI revbenet. Den är ansvarig för membranets rörelse (utbredning).

Det används för spasmer i membranet och minskning av membranrörelsen, för våt hosta - om sputum fastnar på glasväggen.




Zon 7

Ligger vid ögats yttre kant.

Ansvarar för blodcirkulationen i både ögat och hela hjärnan, för ögonbottens tillstånd, kärlsystemet, ögats muskler, ögats inställning och möjligheterna till binokulärt seende (volymseende).


Det används vid kraniocerebrala skador, för att förebygga och behandla skelning, retinala lesioner, venös hypertension i hjärnan. För venös *utflödesobstruktion* med normalt blodflöde genom artärerna, oftast observerat i nedre extremiteterna som en del av kronisk venös insufficiens.+Ytterligare rekommendationer: Zon 7 zon 14 - i händelse av beroenden.



Zon 8

Belägen vid mastoidprocessens bakre kant ovanför den bakre gränsen för hårväxt.

Den är ansvarig för funktionerna i de högre autonoma regleringscentrumen (svettning eller tvärtom torr hud, aggressivitet eller sömnhet, lågt eller högt blodtryck, hög eller låg temperatur), för hormonell reglering, för tillståndet i de luftbärande cellerna, innerörat, Zon 8 rekommenderas för hypotalamiskt syndrom, hörselnedsättning, tinnitus, orimlig yrsel och balansförlust, för att öka blodtrycket, sexuell dysfunktion.



Zon 9


Ligger 1,5 cm bakom det främre hörnet av hårbotten.

Ansvarig för tropiska hormoner (dessa är hormoner i hypofysens främre lob som stimulerar syntesen av hormoner i perifera endokrina körtlar eller har en specifik "tropisk" effekt på vissa organ och vävnader), för frontallobens funktionalitet.

Det används för att harmonisera vagusnervcentrum (parasympatiska nervsystemet), för att återställa beteendereaktioner, vid hyperaktivitet (improduktiv), tankspriddhet, stress, bråkighet, dålig sömnkvalitet - för att normalisera sömnrhythmen och sömnkvaliteten (så att en person kan somna i tid, vakna lätt och utvilad), för att lindra aggression, för att normalisera det vagoinsulära ackompanjemanget

Vid menstruationsstörningar, , dysfunktionell livmoderblödning och alla former av hormonell dysreglering.

+Zon 9 zon 19 - för panikattacker.



Zon 10

Ligger bakom 2 cm ovanför den bakre gränsen för hårväxt.


Ansvarar för subkortikala funktioner, för blodcirkulationen (både i ögat och i hela hjärnan), för att analysera den visuella bilden, för att analysera vad man hör, för att balansera rörelser, för att forma av tal.

Det används för vegetostabilisering, för att förebygga autoallergi, för att optimera immunsystemets reaktion i samband med produktion av specifika antikroppar, vars verkan riktas mot invaderande främmande ämnen. För normalisering av kontrollen av muskelkontraktilitet, för att återställa nervvävnadens känslighet mot histamin, för att normalisera effekterna av histamin.

Rekommenderas vid koordinationsstörningar, försämrad finmotorik, trigeminusneurit, störningar i hörselanalys (efter stroke, hjärnskador, hos barn).

med hypoxisk hjärnskada), för taluppfattning, förståelse av talat språk; vid hörselnedsättning; för snabb inlärning av ett främmande språk.

++Zon 91 zon 9 zon 89 - stabilisering av centrala regleringsnivåer.




Zon 11

Ligger i trapeziusmuskelns område i höjd med underkanten av VII:e halskotan.

Ansvarar för det sympatiska nervsystemet, för klarheten i synen och för den kombinerade funktionen hos syn- och hörselorganen.


Det används vegetativ dystoni - huvudvärk, ögonsmärta, tinnitus, yrsel (det är bättre att ta med zon 73), för att öka BP, för normalisera lungans utflykt (rörelse) vid kronisk bronkit, tuberkulos, emfysem, pneumoskleros, hörselnedsättning, synstörning - om ögats muskler, krampar och det är omöjligt att justera synens klarhet (närmare - längre bort), är det omöjligt att känna igen en bild.



Zon 12

Ligger i området kring . Den ansvarar för kokTOFInle.

Den används för alla dysfunktioner i höftleden.




Zon 13

Belägen på den posterolaterala ytan av tibia på gränsen mellan $1/4$ och $3/4$ tibia.

Ansvarar för det autonoma nervsystemet, rörelsernas plasticitet, matsmältningsrörets rörlighet och talets uppkomst.

Det används återställa vegetativ funktion, gör det möjligt att återställa plasticitet, noggrannhet, mjukhet i rörelsen (efter en posttraumatisk stroke med rörelsestörningar, i osteokondros med radikulärt syndrom, efter ryggmärgsskada, huvudskada), i gallblåsans patologi, gallvägssjukdomar, gallstagnation i levern och gallvägarna, spasmer, muskelkramp, pankreatopatier, sekundär pankreatit, bukspasticitet, parasitangrepp, talbildning utan defekter hos ett litet barn.

- Harmonisering av BHC (autonoma nervsystemet).
- Optimering av hormonsystemet.
- Zonen sätter igång läkningsprocesser.




Zon 14

Ligger ca 6 cm ovanför den yttre .

Ansvarar för sammandragning och expansion av gallblåsan, gallblåsans kropp och den vänstra levergången samt dränering av levern.


Det används för gallstenssjukdom, leverkolik, reflux⁴, för att förbättra gallblåsans rörlighet, post-cholecystektomisyndrom (efter avlägsnande av).



Zon 15

Ligger 3 tvärgående fingrar ovanför den yttre fotleden. Den är ansvarig för hematopoesen.

Det används för störningar i hematopoesen, onkologiska sjukdomar.




Zon 1 b

Ligger mellan IV:e och V:e metatarsofalangealleden.

Ansvarig för gallblåsans bukhinna, intraorganiska bindvävs- och Jag vet inte vad du pratar om.

Den kan användas för alla gallblåsans patologier, böjningar, spänningar, sammanväxningar och sammanväxningar.




Zon 17

Ligger vid roten av nageln på IV tån på av foten.

Ansvarar för lymfflödet från gallblåsan och gallvägarna.

Det används vid kronisk inflammation, berusning, parasitiska lesioner (giardiasis, opisthorchiasis).



Zon 18


Ligger vid den inre kanten av .

Ansvarar för hjärtsäcken, det perikardiella lymfsystemet och hjärtats intraorganiska bindväv.

Det används vid kardioskleros, dyshormonella störningar i hjärtat, vid torpid ¹⁰ arteriell hypertoni, tyrotoxikos, diabetes mellitus.

Detta område kan tas 1,5-2 veckor efter uppkomsten av akut hjärtinfarkt.

Det rekommenderas att du börjar med detta område om du har hjärtskleros.




Zon 19

Sitter vid handleden 1,5 cm ovanför handledsvecket på lillfingersidan.

Ansvarar för hjärtats hälsa, känslor och beteende.

Rekommenderas för attacker av kronisk hjärtsjukdom (varje attack av hjärtsmärta), postinfarktkardioskleros (kan vara i bakgrunden), hjärtskada vid sköldkörtelsjukdom (dyshormonell kardiomyopati), för att optimera den psyko-emotionella bakgrunden, lindra ångest, rädsla, .

Det rekommenderas för hög ångest och glädjeunderskott - den här zonen gör det möjligt att ge lugn, målmedvetenhet, glädje, motivation till aktivitet. Det rekommenderas också för glädjeunderskott, irritabilitet, aggression (tillsammans med zon 76), överdriven rädsla och panikattacker (tillsammans med zon 9).



Zon 20


Ligger på det tvärgående hudveckat vid handleden på lillfingersidan

Ansvarar för metabolismen i myokardiet, endokardiet och det submyokardiella lymfsystemet.

Det används vid ischemi, förgiftning hjärtskada som åtföljer endokrin patologi (tyrotoxikos).

Den rekommenderas för användning när det inte finns några tecken på anginösa hjärtattacker.

Om en person har haft en hjärtattack - zon i bakgrunden.




Zon 21

Ligger på handflatan mellan IV:e och V:e metakarpalbenen. Den är

ansvarig för hjärtats funktion.

Det används vid all myokardiell dysfunktion.

Om en person har haft en hjärtattack rekommenderas det att påverka detta område i *bakgrunden*.




Zon 22

Belägen på nagelfalangen på handens lillfinger på ringfingersidan.

Ansvarar för de blodkärl som för hjärtat till hjärtat, kranskärlen, hjärtplexus, de autonoma plexus, hjärtats ledningssystem (noder, buntar och ben), pacemakern och tunntarmen.

Det används för att bevara och återställa hjärtrytmen och , vid ischemisk hjärtsjukdom, för att skydda kranskärlen från kramp, vid svaghet i sinusknutan, vid dumpningssyndrom⁵, gastrocadiac syndrom.

Om du har *angina pectoris* eller rytmstörningar måste detta område behandlas.




Zon 23

Belägen vid ulnaris kpaFl på basen av lillfingernagelns rot.

Ansvarig för kokTOFlniE i tunntarmen, tarmens lymfsystem och Peyers plack.

Det används vid avgiftning ("rengöring") av tarmen, vid parasitinvasioner, immunsador, toxiska skador, vid ärrdeformitet vid duodenalsårssjukdom.

КИШКИ.




Zon 24

Ligger vid den ulnara kanten av lillfingrets bas.

Ansvarar för tunntarmens peritoneum, bindväven i tarmväggen.

Den används för ärrdeformitet .




Zon 25

Ligger vid huvudet på lillfingrets metakarpalben.

Ansvarig för plexus mesentericus superior, för , för tunntarmens rörlighet, för sfinktern Od ^-

Det används för allergiska manifestationer på huden, för stagnation av galla i levern, för att återställa väggens matsmältning och absorption.




Zon 26

Ligger vid handleden på lillfingersidan.

Ansvarig för tunntarmens funktion - matsmältning från vägg till vägg, absorption av kymus.

Det används vid dysfunktion i tunntarmen.




Zon 27

Ligger mellan ulnas inre epikondyl och ulnarbenet med processus .

Ansvarar för det venösa utflödet från tarmen, metabolismen i tarmväggen (slemhinnans kvalitet) och villifunktionen.

Det används vid epitelialiseringsstörningar, polyper, sår, erosioner i tunntarmen, i strid med väggens matsmältningsfunktion.



Zon 28


Ligger mitt i armbågsveck.

Ansvarar för tillståndet i artärer, vener, lymfkärl - för kärlens inre slemhinna (intima).

Det används vid kärlsjukdomar (arteriellt nätverk - vid skleros, i venöst nätverk - vid trombos), vid parestesier, kontrakturer, trofiska sår vid diabetes mellitus, vid vibrationssjukdom, vid ökat intraokulärt tryck (glaukom).

+Zon 28 zon 3 - avlastning av vener i nedre extremiteterna

- Ett av de viktigaste behandlingsområdena för hjärtsvikt.
- Förebyggande av kärlolyckor (parat med 50).
- Immunokorrigerande.




Zon 29

Ligger 3 tvärgående fingrar ovanför handledsveck.

Ansvarar för arteriellt inflöde, venöst och lymfatiskt utflöde från alla organ samt beteendemässiga reaktioner.

Det används för att optimera kärlkanalen - för att återställa tonen i blodkärlen, ateroskleros, tromboflebit, obliterativ endarterit med trofiska sår, pares, dilatation av kärl (särskilt vener), multipel skleros.

Zon 29 är huvudområdet för hysteri, interkostal neuralgi och fantomsmärtor i övre halvan av bålen.



Zon 30


Ligger vid handledens tvärgående veck på insidan av handleden.

Ansvarar för det venösa systemet.

Den används vid venös stas (stasis), vid otillräcklig blodcirkulation, för att harmonisera blodflöde och utflöde, vid kalla fötter (tillsammans med zon 50 och 80).

Detta område "överför" information från mediciner som används vid behandling av kärlsjukdomar.

+Zon 30 zon 50 + zon 80 - vid cirkulationssvikt.




Zon 31

Ligger på handens palmara yta mellan II:a och III:e metacarpalen.

Ansvarig för alla artärer och kranskärl. Det används för hosta, för hjärtsjukdomar.

Vid hjärtsjukdom, behandla endast detta område i bakgrunden!




Zon 32

Den är belägen vid basen av nagelbädden på tredje fingret på pekfingersidan.

Ansvarig för de viktigaste receptorfälten som är involverade i bildandet av vaskulär tonus (blodtryck) - aortabågen och hjärtganglier (med autonoma plexus), koronar plexus.

Det används för parestesier, kontrakturer vid diabetes mellitus, autoimmun inflammation i endokrina organ och för bevarande av kärlväggen. Detta område "överför" informationen från de läkemedel som rekommenderas för dessa sjukdomar.



Zon 33


Ligger vid basen av nagelbädden på det fjärde fingret på lillfingersidan av handen.

Ansvarig för regleringen av binjurefunktionen - för produktion av glukokortikoider (det är en regulator för immunprocesser, det här är hormoner som gör att kroppen kan överleva i alla situationer) och adrenalin (det är ett hormon för flykt, aggression, överaktivitet), för produktion av vissa könshormoner, för vatten-elektrolytmetabolism, för de cervikala autonoma sympatiska ganglierna, hela sympatoadrenala systemet.

Det används vid alla störningar av hormonell sexuell funktion, reproduktionsfunktion, inflammation (inklusive autoimmun), för att förebygga och behandla bronkospasm, säsongsmässig näsa, hos kvinnor med hormonella störningar (element i

maskulinisering, när mustascher växer, månadscykeln störs etc).

+Zon 33 zon 3 - för polyneuropati, angiopati.




Zon 34

Belägen på handens dorsala yta vid fingerveckan mellan IV och V fingrarna.

Den ansvarar för syntesen av könshormoner (tropisk till periferin), för binjurarnas utsöndring av glukokortikoider, för regleringen av sköldkörteln och bisköldkörteln funktion.

Det används för hypotyreos och hypertyreos; för alla störningar av hormonell sexuell funktion, utlöser tjocktarmen i sköldkörtelpatologi (hypotyreos), för att eliminera hyperkatekolemi (ökade glukokortikoider i blodet efter stress).

För att normalisera sköldkörtelfunktionen rekommenderas att man behandlar detta område i bakgrunden.




Zon 35

Ligger ovanför processus ulnaris på ulna (2 cm ovanför armbågen).

Ansvarig för hormonell reglering av alla typer av ämnesomsättning, sköldkörtel (som en regulator av proteinsyntes och grundläggande ämnesomsättning), bisköldkörtel (som en regulator av kalciummetabolism), tymuskörtel (förening av endokrin och immunreglering), reglering av insulin, glukagon, prolaktinsyntes.

Det används för att harmonisera neuroendokrin reglering, optimera reglering av alla typer av ämnesomsättning, hormonsystem, vid osteoporos, långsam konsolidering (läkning) av en fraktur, vid alla störningar av hormonell sexuell funktion, vid nervdysfunktion vid neurit.

+Zon 35 zon 43 - normaliserar ämnesomsättningen och immunförsvaret. Denna kombination av zoner hjälper också till att återfå förlorade reaktioner och färdigheter.




Zon 36

Ligger nedåt och bakåt från processus mastoideus i höjd med skalpens bakre kant.

Ansvarig för den auditiva analysatorn: innerörat, hörselkvalitet, ljuduppfattning vid olika frekvenser - att uppfatta akustiska vibrationer av låga och höga frekvenser i hela det korrekta området.

Det används för sensorineural hörselnedsättning.




Zon 37

Belägen vid det främre aurikulära skåran.

Ansvarig för tillståndet i hypotalamus, för tillståndet i nervvävnad.

Det används vid multipel skleros, hypotalamisk dysfunktion och andra sjukdomar.




Zon 38

Ligger i ytterkanten av ögonbrynet.

Ansvarar för synnerven.

Det används vid atrofi och toxiska lesioner i synnerven.




Zon 39

Ligger vid basen av nagelbädden på stortån på insidan av foten.

Ansvarig för kolhydratmetabolismen, för innervationen¹⁵, för att kärl blodtillförsel.

Det används vid störningar i kolhydratmetabolismen, för att förbättra innervation¹⁷ av inre organ.



Zon 40


Ligger vid stortåns metatarsofalangealled.

Område 40 på vänster ben ansvarar för mjältens röda massa, antikroppssyntes och modulering av det cellulära immunförsvaret samt för kolhydratmetabolismen.

Det används vid störningar i kolhydrat- och fettmetabolismen.

Zon 40 på frambenet är ansvarig för, nervvävnadsmetabolism, proteinmetabolism (syntes av trypsin, amino-lot, alla hormoner), hudtillstånd.

Det används vid kakexi, i strid med metaboliska processer i nervvävnad.




Zon 41

Ligger vid fotens inre båg.

Ansvarig för immunitet, för energiomsättning, för den gemensamma gallgången, för kalcium- och fosformetabolism, för förhållandet mellan fett- och kolhydratmetabolism, för funktionen hos mediastinala lymfkörtlar, för insulinproduktion bukspottkörteln.

Det används immunitetsstörningar, autoimmun inflammation i endokrina organ, akut och kronisk inflammation, faryngit, tonsillit, laryngit, atrofi i nasofaryngeal slemhinna, störningar i mineralmetabolismen, osteoporos, frakturer, gallsjukdomar, Helicobacter^b. Även ökad trötthet; för att öka energiproduktionen i kroppen - om hunger är svår att bära.



Zon 42


Den är belägen vid bakre kant ca 6 cm ovanför den inre fotleden (på gränsen mellan den nedre tredjedelen och de övre två tredjedelarna av skenbenet).

Ansvarig för hematopoies ("blodmästare"), immunogenes, funktion av hela urinvägssystemet, reglering av månadscykeln hos kvinnor.

Det används för blödningstendenser (särskilt vid kroniska inflammatoriska sjukdomar i nasofarynx), hemoptys, alla sjukdomar i urinvägarna.

+Zon 42 zon 80- i inflammatorisk-degenerativ degenerativ överväxt (skleroserande med ärrbildning).

++Zon 42 zon 80 zon 106- för hemorragisk stroke.



Zon 43

Ligger vid knäledens innerkant 2 tvärgående fingrar nedanför knäskålens kant.


Ansvarar för ämnesomsättning, vatten- och elektrolytomsättning.

På vänster ben ansvarar man för mjältkapseln och bindväven inom mjälten.

På höger ben ansvarar man för bukspottskörtelns kapsel och en del av bukhinnan, den organinterna bindväven.

Det används vid alla metaboliska störningar; för att öka effektiviteten.

+Zon 43 zon 35 - för att normalisera all ämnesomsättning, normalisera primär och sekundär immunitet. Denna kombination av zoner hjälper också till att återställa förlorade färdigheter och reaktioner.




Zon 44

Ligger vid ögonhållans nedre kant.

Ansvarar för ögats slemhinnor, för kvaliteten och genomskinligheten hos ögats medier (inklusive linsen).

Det används vid omogen grå starr, i tillståndet efter gråstarrsoperation.




Zon 45

Ligger ett tvärgående finger nedanför kanten på ögonhållan.

Ansvarig för de metaboliska processerna i nasofarynx, för tillståndet i de adventitiva (maxillära), för graden av sekretproduktion.

Det används vid bihålör i överkäken, polyper i bihålorna i överkäken, atrofi i slemhinnan i bihålorna i överkäken.




Zon 46

Ligger på området för palpation av halspulsådern..

Ansvarar för ögats metaboliska processer, ögonskador från sköldkörtelsjukdomar, kärlhälsa, sköldkörtelfunktion.

Det används för behandling och förebyggande av kärlolyckor, hjärklappning, sköldkörtelsjukdomar (utom cystor, knölar).


Var försiktig så att du inte tar zon 46 samma dag som zon 65 och Zon 50.



Zon 47

Ligger vid den främre kanten av nodusmuskeln. Den ansvarar för sköldkörteln.

Det används för sköldkörtelsjukdomar (utom cystor, noduler).




Zon 48

Placerad 2 tvärgående fingrar nedanför navelsträngen, 2 tvärgående fingrar lateralt om den främre mittlinjen.

Ansvarar för tunntarmens funktion.

Det används vid störningar i väggens matsmältning och absorption, vid vidhäftningar skleroserande processer i könskörtlarna.




Zon 49

Ligger 4 tvärgående fingrar nedanför navelsträngen, 2 tvärgående fingrar lateralt om den främre mittlinjen.

Ansvarar för tjocktarmens funktion.

Används för att optimera motiliteten och funktionen i tjocktarmen - vätskeupptag, upptag och användning av järn och B-vitaminer, immunförsvar.



Zon 50

Den är belägen i den övre tredjedelen av tibias anterosuperiora yta under patellas nedre kant med 3 tvärgående fingrar.


Den är ansvarig för magsäckens längsgående veck (så att vätskan passerar genom magsäcken utan att dröja sig kvar), venöst utflöde från magsäcken (de flesta inflammationer uppstår mot bakgrund av venös stas).

Det används för att förbättra det venösa utflödet från mjälten och magen, vid tendens till polyper, för att förbättra blodcirkulationen i huvudkärlen, för att återställa tankemönster, produktivitet i tänkandet (justerar normativt beteende), för behandling och förebyggande av kärlolyckor, vid otillräcklig funktion sfinkter i matstrupen och magen, reflux ⁴, atrofisk gastrit, gastrisk polypos, magsår

Den rekommenderas för att harmonisera hela organismen, för allmän tonisk effekt. Det är "punkten för hundra sjukdomar".

++Zon 50 zon 94 zon 89- produktiv lugnande (zonerna har en allmänt harmoniserande effekt som påverkar beteendet).

Allmänna råd: Var försiktig - zon 50 bör inte tas samma dag som zon 65 och zon 46!




Zon 51

Ligger på främre yta 4 cm under mittpunkten för avståndet mellan knä- och fotled mellan tibia och fibula.


Ansvarig för tillståndet i tarmens mikroflora.

Det används vid dysbakterios i tunntarmen (specifikt område).



Zon 52

Den är belägen i fotledsområdet på fotens baksida. Ansvarig för magens tillstånd, för bröstkörtlarnas tillstånd. Den används för magsår, erosioner, polyper. För mastit, zon 52 och sedan zon 54.




Zon 53

Ligger mellan metatarsofalangeallederna på fotens II:a och III:e tå.

Ansvarig för bindväven i och runt magsäcken och för kvaliteten på ärrbildningen vid magsårssjukdom.

Det används för ärrdeformitet vid magsårssjukdom, för vidhäftningar som omger magen, för peritoneal skada (det är bättre att agera i bakgrunden).




Zon 54

Ligger vid ytterkanten av nageln på fotens 2:a tå.

Ansvarar för magens lymfkärl, för tonus och funktion i hela kärlsystemet, kanaler och organ med glatt muskulatur samt för tonus i bäckenorganens muskler.

Det används i alla atrofiska och degenerativa processer, med erosioner i magslemhinnan på grund av kronisk njursvikt, med blyförgiftning, kvicksilver, ketoacidosis⁷ (metabolisk, diabetisk), förgiftning, magsjukdomar i alla allergiska processer, med spasmer, för att förebygga sjukdomar i magen, sköldkörteln och bröstkörtlarna.




Zon 55

Ligger på den yttre tredjedelen av subklaviska regionen.

Den är ansvarig för jämvikten, balansen i hela organismen, för en persons personlighet (sammanfaller med den kinesiska punkten "Nyckeln till kejsarens skatt").

Det används för aktivering av skyddande och återställande processer i kroppen, för att starta läkningsprocesser, regenerering, för att erhålla systemisk avgiftning ("rengöring" lymf - intercellulär vätska), för att öka motståndskraften mot hypoxi, med någon Intoxikation, med några störningar i centrala nervsystemet, känslor, beteendemässiga reaktioner, tankefunktioner, med någon sexuell dysfunktion.




Zon 56

Den är placerad vid kanten av ulnarisveckets veck inne vid den radiella kanten (i ulnarisfossa, närmare ytterkanten).

Den ansvarar för lungans bindväv (intraorganisk och periorganisk - runt lungan), för lungsäckens tillstånd och har en ödemhämmande effekt.

Det används för förebyggande och kompensation av bindvävsdegeneration vid lungsjukdomar - (schwartzs, pneumoskleros, emfysem), vid tendens till ödem, vid våt väsande andning, vid torr eller våt hosta, vid hematoma, för att få effekten av osmotisk diures (diuretisk effekt) - efter zon 66 (eller 67, 69).




Zon 57

Det är på pulsområdet.

Ansvarig för den svällningshämmande effekten.

Det används för att lindra vävnads- och cellödem, för att stimulera venöst utflöde, vid alla störningar i centrala nervsystemet med svullnad av hjärnvävnad - hypoxi, trauma, förgiftning, intrakraniell hypertoni, neurit, all inflammation, vid plasmavettnings (processen med "läckage" av blodplasma genom blodkärlens väggar, som observeras när de senares permeabilitet ökar), för att lindra svullnad i bronkialträdets och tendens till bronkospasm, vid irriterat, för att förhindra eosin och neutrofil infiltration, för att normalisera lymfflödet från bronkus.




Zon 58

Ligger vid basen av tummens nagel.

Ansvarar för lungornas villusepitel, bronkialplexus (innervering av väggen i medelstora och stora bronker), mediastinalplexus och anastomoser vid hjärtsvikt i vänster kammare.

Det används för att öka vävnadens motståndskraft mot hypoxi, inklusive fetal hypoxi, hjärtinfarkt, ihållande anginaattacker, när gasutbytet i lungorna är minskat (vid sjukdomar i), för att återställa gasutbytesfunktionen i lungorna, för att eliminera dyspné, vid smärta av olika ursprung, vid hudmanifestationer av allergier (diates), vid allergiska manifestationer i , vid dysbakterios.




Zon 59

Den är belägen vid basen av nagelbädden på andra fingret på tumsidan.

Ansvarig för lymfflödet från tjocktarmen, reglering av tjocktarmens funktion, tjocktarmsväggens hälsa, tarmens immunfunktion, avgiftning och barnets immunstatus.

Används för att återställa rörligheten och funktionen i tjocktarmen, för kolit, dysbakterios, polyper, autoimmuna sjukdomar i tarmen, för att eliminera berusning från tjocktarmen hos äldre, vid infektions- och parasitsjukdomar, hos barn med diarré, vid allergiska lesioner, vid Crohns sjukdom (tillsammans med zonerna 60, 61).




Zon 60

Ligger vid basen av pekfingret på tumsidan.

Ansvarar för den periorgana och intraorgana bindväven i tjocktarmen.

Det används för förebyggande och behandling av sammanväxningar i tjocktarmen, fissurer, hemorrojder, Crohns sjukdom (tillsammans med zon 61).




Zon 61

Den är placerad på handryggen vid pekfingrets metakarpalhuvud.

Ansvarig för plexus subcostalis superior, för tarmens motilitet, innervation och tonus, för reglering av tonus i tjocktarmens artärer.

Det används för att förebygga och behandla alla former av störningar av metabolism och motilitet i (inklusive tarmpares), för att återställa immunreaktiviteten i kroppen i allmänhet och inklusive dysbakterios, inflammation, Crohns sjukdom (tillsammans med zon 60).




Zon 62

Den sitter på handryggen, mellan mellanhandsbenen I och II, och kan identifieras i slutet av det veck som bildas när man för ihop fingrarna I och II.

Ansvarig för plexus iliaca, för tjocktarmens rörlighet, för reglering av arteriell tonus och för adekvata regenerativa processer i tjocktarmen.

Det används för alla former av störningar i motilitet och metabolism i tjocktarmen (förstoppning, diarré), immunsystemstörningar polyper, atrofi i slemhinnan i tjocktarmen, i närvaro av stinkande mörkgrönt sputum, för att harmonisera avgiftningsfunktion, , för att harmonisera hela organismen.




Zon 63

Ligger på utsidan vid det ulnara vecket, som bildas när armen böjs i armbågsleden.

Ansvarar för tillståndet i tjocktarmens slemhinna (för slemhinnans basalmembran), för kvaliteten på ämnesomsättning, för avgiftning (rening) av hela kroppen.

Det används att optimera immunförsvaret, avgiftning, polypbildning, atrofiska processer i slemhinnan och underhuden, svullnad i underhuden, sårbildning, divertikulos, kramp i tjocktarmen, för att förbättra hudens utsöndringsfunktion, för att öka hudens känslighet, för att öka hudens motståndskraft mot hypoxi, vid allergiska processer (oavsett lokalisering), vid inflammationer, för att kompensera för eventuell patologi i ÖNH-organen.




Zon 64

Ligger i det nasolabiala vecket.

Ansvarig för tillståndet i nässvalget.

Det används för förebyggande och behandling av inflammatoriska sjukdomar i nasofarynx, processer i maxillary bihålor, vid maxillary bihåleinflammation.



Zon 65


Den är belägen på fotens plantaryta mellan II:a och III:e mellanfotsbenet, på gränsen mellan den främre tredjedelen och den bakre tvåtredjedelen av sulan, i den fördjupning som bildas när tårna böjs.

Ansvarig njurplexus, njurartärens lumen, plexus suprarenale, katekolaminnivåer⁹, reglering av cirkulerande blodvolym, igenkänning av "vän eller " i njurarna, nasofaryngeal slemhinna och blodtillförsel till njurarna.

Det används diuretisk effekt, för reflux, för att minska koncentrationen av katekolaminer i blodet, för att minska artärtrycket, för att bevara njurarna vid arteriell hypertoni, för att skydda nasofaryngeal slemhinna från atrofi och degeneration (från förstörelse av nasofarynx).

I närvaro av yrkesrisker hög temperatur, vibrationer, visst damm, vissa kemikalier), långvariga infektiösa inflammationer i nasofarynx, dammrhinit, förebyggande och behandling av nefroskleros och stenbildning vid diabetes mellitus, tvärgående plattfötter.

Zon 65 är en zon för förebyggande och behandling av kärlolyckor; det rekommenderas att man börjar med den om blodtrycket är kraftigt förhöjt. Var försiktig - zon 65 bör inte tas samma dag som zon 46 och zon 50!



Zon 66

Ligger på insidan av fotleden mellan fotleden och hälsenan.


Ansvarig för njurmetabolism, kalyx, venöst utflöde, epitelkvalitet, reninsekretion, upprätthållande av kalium-natriumbalans, reglering av cirkulerande blodvolym vid njursjukdom och vävnadsvatteninnehåll.

Det används för forcerad diures (diuretisk verkan - driver vatten ur cirkulationen in i urinblåsan), vid pyelonefrit, primär eller sekundär skrupna njurar, vid glomerulonefrit (när njurarnas filtreringskapacitet lider), vid nedsatt njurfunktion mot bakgrund av diabetes mellitus (diabetisk nefropati)

eller på bakgrund av berusning, vid störningar i proteinmetabolismen, vid långvarig arteriell hypertoni - för njurbevarande, vid metabolisk oxalaturi, för mild hypotensiv verkan, för förebyggande och behandling av pyelonefrit, stenbildning, för att förbättra hudens utsöndringsfunktion, vid sklerosering (när sklerosprocessen ännu inte är klar), med grova ärr, för att återställa tjocktarmens rörlighet. Effekten på zon 66 gör det möjligt att normalisera njurarnas utsöndrings- och filtreringsförmåga och samtidigt kompensera för högt blodtryck.

Zon 66 + zon 67 + zon 69 - under de första timmarna efter hjärnskador, vid akut cerebral cirkulationssvikt (stroke) - för diuretisk effekt.

++Zon 66 + zon 67 + zon 103 för en skrupnad njure.



Zon 67


Ligger i området kring hälbenet nedanför fotleden på insidan.

Ansvarig för njurarnas kalyxsystem, för ämnesomsättningen i njurarna, för det venösa utflödet, för epitelets kvalitet, för reninsekretionen, för upprätthållandet av kalium-natriumbalansen, för det "vita blodet", för det autonoma upprätthållandet av tonen i tunn- och tjocktarmens kärl.

Det används i inflammatoriska processer (pyelonefrit) för att optimera njurens lymfsystem, i primära eller sekundära skrupna njurar, för att stoppa överväxt av bindväv vid hypoxi, för att öka urinproduktionen, vid parenkymatös renal hypertension, vid nefropati under graviditet (mild diuretisk effekt och blodtryckssänkning), för att återställa rörligheten


i tjocktarmen, för att återställa tonen i hemorrojder, för att balansera bindväven under sklerosering - för att bilda icke grova ärr.

++Zon 66 +zon 67 +zon 69- för diuretisk verkan (forcerad diures) under de första timmarna efter hjärnskada, akut cerebral cirkulationssvikt.



Zon 68


Ligger under den nedre kanten av den mediala (inre) fotleden.
Den är ansvarig för bindvävens tillstånd.
Den används vid sammanväxningar i bäckenet.



Zon 69

Ligger 2 tvärgående tår ovanför nivån för den inre fotleden.
Den ansvarar för lymfdränaget från njurarna och binjurarna.
Det används för avgiftning, vid autoimmun njurskada, vid glomerulonefrit, vid reaktiv nefrit, vid kronisk binjureutmattning (kronisk stress i dekompressionsstadiet), vid toxisk binjureskada (vid brännskador), vid förvärring av pyelonefrit på bakgrund av urolithiasis, om blodtrycket stiger vid den tiden (löser problem med inflammation och förhindrar förändringar i det kalyx-lochanösa systemet), vid långvarig bronkit för att torka sputum, vid ihållande rinnande näsa, naftizinberoende (anti-ödem effekt), vid njurskleros.

++Zon 69 +zon 67 +zon 66- för diuretisk verkan (forcerad diures) under de första timmarna efter hjärnskada, vid akut cerebral cirkulationssvikt.




Zon 70

Ligger vid den inre änden hamstringsskinnet.
Ansvarar för njurens bindväv, njurkapseln och nefronets syntetiska funktion.
Det används för förebyggande och behandling av sklerotiska processer, bl.a. vid sekundärt skrupna njurar, för att återställa cellernas förmåga till reglerande påverkan (optimering av receptorkänsligheten), för att återställa vävnadernas känslighet för hormoner, för att förebygga urolithiasis, för störningar i det renala-lochanösa systemet vid pyelonefrit, för mild diuretisk verkan, för profylax av nefroskleros, för vatteninnehållande cystor på äggstockarna, för profylax och behandling av ärrbildning på huden.

Behandling i ett steg av zon 70 och 4 (samma dag) används för att återställa och normalisera bindvävens funktion - vid skleros (ersättning med bindväv), alla autoimmuna processer, allergier, dysfunktioner i leder, störningar i organutvecklingen, tillväxtsjukdomar (när ett organ växer snabbt och andra organ inte hänger med, hållningsstörningar.

Zon 70 - saktar ner kroppens åldrandeprocess.




Zon 71

Ligger vid ögats inre kant.

Ansvarar för den visuella analysatorn, vätske kvalitet och -kvantitet.

Det används för dysfunktion i tårkanalen, allergiska lesioner i ögonslemhinnan, virussjukdomar i ögonslemhinnan, glaukom, behandling av skelning.




Zon 72

Ligger vid den inre kanten av ögonbrynet.

Ansvarar för sklerans, de främre bihålornas och de appendikulära bihålornas tillstånd.

Det används vid vaskulära ögonskador, hemoftalmus, inflammation i bihålorna (bihåleinflammation), nasalitet⁽¹⁰⁾.



Zon 73


Ligger i regionen kring hjässbenet.

Ansvarig för de subkortikala kärnorna, för den motoriska sfären.

Det används för vegetostabilisering (optimering av det sympatiska nervsystemet), när huvudet är "tungt", vid störningar i rörelse och tonus, vid tvångsrörelser, tics, trigeminusneurit.

+Zon 73 + zon 11-om 'tungt' huvud".

+Zon 73 + zon + 79- för rörelse- och tonusstörningar.



Zon 74

Beläget i området något ovanför den bakre gränsen för hårväxt 2 cm på sidan om mittlinjen mellan I och II halskotorna.

Ansvarig för cocTOFniE i muskelsystemet (inklusive hjärtmuskler, i den mjuka gommen, struphuvudet, muskler som reglerar stämbanden, muskler som bildar svalget, muskler som omger hörselröret och bibehålla normal ton för att lindra trycket i mellanörat).


Det används för att återställa muskelvävnadens funktion (inklusive hjärtmuskeln), med hjärtvärk under psyko-emotionell stress, med smärta åtföljd av rädsla, med venös insufficiens, med artros och artrit, med polyneuropatier.

+Zon 74 zon 80 - kombinationen av dessa två zoner återställer skelettmusklernas funktion och ton (där den var förhöjd - kommer att minska, låg - kommer att stiga, normaliseras), för att återställa aktiv rörelse, för att återställa ett adekvat muskulärt ramverk, för korrekt hållning, vid heshet, vid kvävning vid sväljning och drickning, vid matintag i nasofarynx, vid problem med en professionell föreläsare, sångare - för att bevara ljudåtergivningen, foniatri, vid förlamning, plegi,

parkinsonism, för att öka hastigheten på nervimpulsens ledning längs nervfibern.

+Zon 74 + zon 79 - arbetar med muskelvävnad för skolios.

+Zon 74 + zon 80 - vid tilltagande muskelatrofi (degeneration) eller före en osteopatisk behandling.



Zon 75

Belägen 2,5 cm lateralt om tagguts-kottet på bröstkota II.


Ansvarar för benhälsa, kalciummetabolism, brosk (brosk i luftstrupen, de beniga och broskiga delarna av).

Det används för att optimera benfunktionen, vid avvikande nässkiljevägg, nasofaryngeala och laryngeala förändringar till följd av trauma och inflammatoriska sjukdomar.

+Zon 75 + zon 80 - reparation av ben.

+Zon 75 + zon 79 - för allergier, bindvävsdysplasier.

++Zon 75 + zon 43 +zon 70 - återställande av benvävnadsmetabolism.




Zon 76

Den är belägen 2,5 cm lateralt om tagguts-kottet på den XI bröstkotan.

Ansvarar för binjurarnas hälsa.

Det används för känslomässiga störningar, för frakturer, för förtjockning av muskler.

+Zon 76 + zon 19 - för brist på glädje, för eliminering av irritabilitet, aggressiva tillstånd.




Zon 77

Belägen 2,5 cm lateralt om tagguskottet på I ländkotan.

Ansvarar för urinblåsans hälsa, , ägglossning, äggimplantation och spermatogenes.

Det används vid dysfunktion i urinblåsan för att förbättra produktionen av endogena glukokortikoider⁽¹²⁾-Vid infertilitet - för att förbättra mognaden av ett tillräckligt antal kvalitetsspermatozoer, för oocytbildning, för ägglossning, för normal oocytinplantering.




Zon 78

Belägen 2,5 cm lateralt om tagguskottet på ländkota II.

Ansvarig för binjurarnas syntes av kortisol.

Det används för att aktivera tarmmotilitet, för att stimulera benreparation (reparation).



Zon 79

Ligger mitt i fossa hamstring.

Ansvarar för epitel i bukhålan och bäckenorganen, ämnesomsättningen i urinblåsans vägg och könsorganen, det venösa utflödet från det urogenitala systemet (endometrit, venös stas), för muskeltonus, för bindvävens tillstånd, för blodets tillstånd, för de organ som ger ett fungerande reproduktionssystem (prostata med sekret, rör med villi, gulkropp), för balanserade förhållanden i hela det urogenitala systemet.

Det används för allmän harmonisering av organismen, för harmonisering av bindväven som system, för optimering av epitelets vätskeutsöndring, för musklers tendens till kramper och spasmer, för stimulering av njurarnas utsöndringsfunktion, för förbättring av det venösa flödet.


blodflöde till hjärtat, vid tendens till högt blodtryck, ödem, vid rörlig hälta (tillsammans med zon 80), vid stillastående kronisk torpid¹² inflammatorisk process, vid intracellulära parasiter (klamydia, toxoplasma), vid cystor på gulkroppen, för att bevara reproduktiv hälsa.

+Zon 79 zon 74 - arbeta med muskelvävnad för skolios. +Zon 79

zon 75 - för allergier.

+Zon 79 zon 101 - förebyggande och behandling av skleros, endometriosis. +Zon 79

zon 73 - för alla störningar i rörelse och ton.



Zon 80

Den är belägen mellan den yttre fotleden (mitt på fotleden) och hälsenan.

Ansvarar för de inre och yttre könsorganen och urinblåsan, för mikrocirkulationen^{*(4)}.

Det används för att återställa blodcirkulationen i små blodkärl, för att få en smärtstillande effekt, vid morfologiska störningar i kroppen i urinblåsan och könsorganen, vid funktionsstörningar i urinblåsan (ansamling och utsöndring av urin), för att starta reproduktionsprocesser, före träning, vid hjärtsmärta, vid infertilitet - för att återställa könsorganens funktion (skapande av gonader, funktion att bära fostret), vid fibro-, infertilitet - för att återställa könsorganens funktion (skapande av gonader, funktion att bära fostret), vid fibro-, infertilitet - för att återställa könsorganens funktion (skapande av gonader, funktion att bära).


myom, endometrios, leukoplaki, ovariepatologi (apoplexi, ischemi, cystor), klåda av något ursprung.

+Zon 80 + zon 74- vid tilltagande muskelatrofi (degeneration) eller före en osteopatisk behandling.

+Zon 80 + zon 75 - för optimering av benfunktionen.

+Zon 80 + zon 57 - smärtlindrande effekt, för osteokondros. +Zon 80 + zon 101 - för skleropolykystisk fibros.

+Zon 80 +zon 42 - vid inflammatorisk-degenerativ genital överväxt (skleroserande med ärrbildning).
Zon 80 är zonen för lång livslängd!




Zon 81

Ligger på fotens ytterkant - vid basen av V metatarsalbenet.

Ansvarar för urinblåsans nervplexus, sfinkterstatus, urinledarstatus, igenkänning av inkräktare i kroppen.

Det används återställa tonen i urinorganens muskler, för sfinktersvaghet, återflöde⁴, urininkontinens, irritation i urinblåsan, för alla autoimmuna former av infertilitet, för störningar i kvinnors månadscykel.




Zon 82

Ligger vid basen av nagelbädden på lilltån på fotens yttre sida.

Ansvarar för lymfflödet från urinblåsan och könsorganen, för systemets förmåga till självrensning och för bäckenets diafragma.

Det används vid avgiftning, för att eliminera lokal immunodeficit, med myom, cystor, infertilitet, med kongestiva inflammationshärdar i urinvägarna.

Det rekommenderas att zon 82 behandlas i bakgrunden under en lång tidsperiod efter aktiv exponering och medicinsk behandling av adnexit¹⁵, urogenitala infektioner, dyshormonella¹⁶ tillstånd.




Zon 83

Placerad 2 tvärgående fingrar ovanför bröstets led.

Icke-parietal zon.

Ansvarar för livmodern som organ - hos kvinnor och prostatan - hos män.

Det **används vid** behandling av livmoder- och prostatasjukdomar.




Zon 84

Ligger 5-6 cm ovanför naveln. *Den palpebrala zonen.*

Ansvarig för optimal innervation¹⁷ av lungorna, för tillståndet i solar plexus.


Används vid sjukdomar i andningsvägarna, buksjukdomar, sjukdomar i bukorganen.



Zon 85

Ligger på gränsen mellan den mellersta och den nedre tredjedelen av bröstbenet. *Den palpebrala zonen.*

Ansvarig för immunitet, för autonom reglering. Det används vid alla akuta inflammationer.




Zon 86

Den är belägen i området för den mellersta tredjedelen av bröstbenet. *Den palpebrala zonen.*

Ansvarig för immunförsvaret, för innervationen⁽¹⁷⁾ av hjärtat.

Det används vid alla akuta inflammationer, för antiarytmiska¹⁸ och antianginala¹⁹ effekter, vid hjärtrytmrubbningar, vid svår som strålar ut i halsen, vid bultande i öron.




Zon 87

Den är belägen i området kring den övre tredjedelen av bröstbenet. Oparad zon.

Ansvarig för immunitet, för thymuskörtelns tillstånd.

Det används vid akut inflammation hos barn.




Zon 88

Ligger under tagguts-kottet på den andra ländkotan. *hμτοτŚ aŰΩ*

Ansvarar för innervation¹⁷ och blodförsörjning till allt under diafragman (nedre halvan av bålen, nedre extremiteterna, allt i buken och bäckenet); för viljemässig fördröjning av defekationen (reglering av defekationen genom viljan).

Det används för alla dysfunktioner i organ som är under diafragman.



Zon 89

Ligger mellan VII halskotan och I bröstkotan. *Oparad zon.*


Ansvarar för innervation¹⁷ och blodförsörjning till alla organ ovanför diafragman (lungor, luftstrupe, matstrupe, hjärta, övre extremiteter, hals, huvud).

Används vid patologi i organ ovanför diafragman för att kompensera för försämrat arteriellt inflöde och venöst utflöde vid all hjärnpatologi, vid förgiftning, för att återställa innervationen i ÖNH-systemet, för att optimera funktionen hos hörselanalysatorn och nasofarynx.

+Zon 89 zon 94 - för att normalisera termogenesen⁽²⁰⁾, vid överexcitation, för att stabilisera det sympatiska nervsystemet.

+Zon 89 zon 50- vid instabilt tryck (särskilt vid meteorologiskt beroende).

++Zon 89 zon 91 zon 10- för att stabilisera centrala regleringsnivåer.




Zon 90

Belägen mellan nackbenet och I halskotan, 1,5-2 cm ovanför hårväxtgränsen. *Oparad zon.*

Ansvarar för kognitiva funktioner (minne, uppmärksamhet, psykomotorisk koordination, tal, objektuppfattning, räkning, tänkande, orientering, planering och kontroll av högre mental aktivitet).

Det används för störningar i tankefunktioner, inklusive efter trauma (rekommenderas att tas tillsammans med zon 57), för hörselnedsättning, för försämrad ljudåtergivning.



Zon 91


Det är på toppen av huvudet. *Oparad zon.*

Ansvarar för kognitiva funktioner (minne, uppmärksamhet, psykomotorisk koordination, tal, objektuppfattning, räkning, tänkande, orientering, planering och kontroll av högre mental aktivitet), högre centra, mekanism för att upprätthålla renheten i den inre miljön, för normativt beteende, för klarhet i tanken, för klarhet i synen, för optimal aptit.

Det används för att normalisera beteendet när självbevarelsedriften gått förlorad, för att optimera aptiten, för att förbättra och synskärpan.

++Zon 91 zon 89 zon 10- för att stabilisera centrala regleringsnivåer.

+Zon 91 zon 94- för normalisering av beteendet: eliminering av hysteroida och fobiska reaktioner (rädslor).




Zon 92

Belägen 3 cm anteriort från huvudets ovensida längs mittlinjen. *Oparad zon.*

Ansvarar för tillståndet i det autonoma nervsystemet.

Det används vid vegetostabilisering - vid värmeslag, vid yrsel och vid behandling av huvudvärk, snurrande.




Zon 93

Ligger i området kring *höger* axelled (bakifrån och upp). *Oparad zon*.

Ansvarar för blodets reologiska²¹ egenskaper.

Det används för att förbättra blodets reologiska egenskaper i program för förebyggande och behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, för att förhindra ischemi och angina pectoris.



Zon 94


Den är belägen i området kring geten.

Ansvarar för tillståndet i det autonoma nervsystemet, för normala beteenden och reaktioner.

Det används för vegetostabilisering, för lätt lugnande (lugnande) verkan, för att avlägsna krångliga rörelser, tankar, för att återställa tillståndet av lugnt, balanserat, produktivt tänkande, normalt beteende, för självtvivel, dödsrädsla, för att erhålla antistressoreffekt samt för eliminering av svettning.

+Zon 94 zon 89- för att eliminera sympatiska nervsystemets redundans.

++Zon 94 zon 50 zon 89- för produktiv lugnande.




Zon 95

Det är mitt i handflata.

Ansvarar för den normala hostreflexen⁴.

Det används för en hostdämpande effekt.




Zon 96

Den är placerad i sakralzonen. *hμτοτŚ aŰΩ*

Ansvarar för den sexuella funktionen.

Används för att återställa erektionen hos män (vid erektil dysfunktion) och för behandling av frigiditet hos kvinnor (minskad libido).



Zon 97


iggar i området på foten framför och ner från den inre .

Ansvarar för leverns centrala venösa system, lymfflödet från levern och avgiftningen.

Det används vid autoimmuna leversjukdomar, allergisk , för behandling av toxisk leverskada, kronisk aktiv hepatit, Hbs-Ag (australisk antigen) bärare.

Tillståndet i detta område avgör om akut hepatit övergår i kronisk hepatit, cirros eller leversvikt.

Detta område bör inledas vid kroniska leversjukdomar, om det finns hopp om återhämtning - vid hepatit.




Zon 98

Ligger i den fördjupning som bildas när armen lyfts; sträcker sig till deltamuskeln.

Ansvarar för stabilisering av cellmembranet.

Det används för membranstabilisering vid allergier, autoimmuna sjukdomar och chock⁽²²⁾.



Zon 99

Ligger på fotens inre kant, bakåt och nedåt från huvudet på huvuden av

1:a mellanfotsbenet.


På vänster ben ansvarar för retikulo-endotelialsystemet (vävnadsvagalt makrofagsystem²²), för deltagande i hemmetabolism och för lokal immunitet i alla organ.

Det används för ~~ÖS~~ förstöring av röda blodkroppar, för att optimera immunförsvaret.

På höger ben är ansvarig för lipidmetabolismen, för venöst utflöde från

centrala nervsystemet.

Det används för könshormonbrist, dysfunktion i centrala nervsystemet (encefalopati).



Zon 100

Ligger framför den inre fotleden.


På vänster ben ansvarar för mjältens vita massan - humoralt immunsvär - immunsystemets svar i samband med produktion av specifika antikroppar (T-dödare, T-suppressorer, T-hjälpare).

Det används vid inflammation i tarmarna, lungorna, lymfkörtlarna, immunbrister, autoimmuna sjukdomar, för någon form av intoxication.

På höger ben ansvarar den för, purinmetabolismen (urinsyrametabolismen), DNA-replikationen²⁴, regleringen av vatten-elektrolytmetabolism..

Det används vid hydrering av vävnader (intracellulärt och parenkymatöst ödem, inklusive myxödem, hydrocefalus) - analog med osmotisk diures.

Zon 100 zon 40 är för DNA-syntes (zon 100 i början, zon 40 efter några dagar).



Zon 101


Belägen vid metatarsofalangealleden på fotens lillfinger.

Ansvarig för membranstabilisering allergier, autoimmuna sjukdomar och chocktillstånd.

Det används vid sammanväxningar av det lilla bäckenet, skleropolycystos.

++Zon 101 zon 79 - för förebyggande och behandling av sklerosering, för endometrios (zon 101 zon 79- på ena sidan och zon 4 på andra benet).

Zon 101 + zon 80- för skleropolycystisk fibros.




Zon 102

Ligger under och framför den yttre fotleden i fotleden.

Ansvarar för leverplexus, gallgångarna, gemensamma gallgången, gallgångarna i höger och vänster leverlob, vesikulärgången, höger levergång.

Det används vid alla former av, gallstagnation i levern - i syfte att dränera, återställa rörligheten och eliminera återflöde⁽⁴⁾.

++Zon 102 + zon 14 + zon 13 för postcholecystektomisyndrom.




Zon 103

Ligger på insidan av fotleden framåt och nedåt från den inre fotleden.

Ansvarar för njurens kortikala skikt och den pyelorenala regionen (filtrerande och reabsorberande delar).

Används vid glomerulonefrit, njurtoxicitet, hemorragisk feber, urinretention, kronisk njursvikt, akut njursvikt, hosta (ger volym och fukt till slem).

++Zon 103 + zon 66 + zon 67 är för en "skrumpnad" njure.




Zon 104

Ligger vid ytterkanten av axelns biceps brachii-muskel.

Ansvarar för matsmältningen från vägg till vägg och absorptionen av mat i tarmen.

Det används i komplexa antiparasitära program för att förhindra komplikationer som orsakas av parasitgifter (toxiner) som förstörs under den antiparasitära behandlingen.

+Zon 104 + zon 25 - för laktosintolerans.




Zon 105

Lokaliserad till strålbenets processus styloideus 1,5 cm ovanför handleden.

Ansvarar för bronkernas tillstånd.

Det används vid kronisk bronkit med astmatisk komponent, allergiska lunglesioner, vid bronkialastma, vid autoimmuna lungsjukdomar, vid eosinofil infiltration av lungorna.




Zon 106

Ligger i slutet av det tvärgående hudvecket vid på tumsidan.

Ansvarar för kvaliteten på de metaboliska processerna i lungorna.

Det används vid och förebyggande av arbetssjukdomar, långvariga pneumonier, amyloidos, cystisk fibros, autoimmuna lungsjukdomar.

++Zon 106 + zon 80 + zon 42 för hemorragisk stroke.




Zon 107

Ligger på handens dorsala yta mellan IV:e och V:e metakarpalbenen.

Ansvarar för, bisköldkörtlarna och tymuskörteln.

Det används för att optimera sköldkörteln och bisköldkörteln
körtel, thymuskörteln, för att snabbt reagera på förändrade
CJA SLOVIA.



Zon 108

Ligger vid basen av nagelbädden på fotens 3:e tå på 4-tå-sidan.

Ansvarar för hudens lymfkärl.

Används för att förbättra hudens dräneringsfunktion - i avgiftningsprogram.

Villkor

1. Portalsystemet är en ven eller ett system av vener som börjar och slutar med kapillärer. Portsystemet kallas ofta det hepatiska portsystemet och utgörs av portvenen och dess biflöden. Blod från mjälte, magsäck, bukspottkörtel, tunn- och tjocktarm rinner in i portavenen till levern, där portavenen förgrenar sig i många små kapillärer som kallas sinusoider. Dessa kapillärer transporterar de näringsämnen som har absorberats från tarmen till levern och vidare till levercellerna.
2. Cytostatika - medel som förstör celler eller stör celldelningen (t.ex. cancerceller eller celler i immunsystemet, vilket minskar svårighetsgraden av autoimmuna inflammatoriska reaktioner riktade mot egna organ och vävnader)
3. Det mikrosomala systemet är utformat oxidativ modifiering av fettlösliga produkter i levern, inklusive kolesterol.
4. Reflux (latin refluo - att flöda bakåt) är ett bakåtlöde av innehållet i ihåliga organ jämfört med sin normala rörelse. Reflux kan vara normalt för viss fysiologisk process eller vara en orsak till sjukdom. Dysfunktion i de sfinkter som avskiljer de ihåliga organen är en vanlig orsak till patologiskt återflöde. Det ämne som rör sig i motsatt riktning mot den naturliga riktningen till följd av reflux kallas refluxat eller refluxat.
5. Dumpningssyndrom är ett tillstånd som är en vanlig komplikation vid magsäckskirurgi, t.ex. gastrisk resektion (borttagande av en del av magsäcken). Den utlösande faktorn för dumpningssyndrom anses vara den snabba överföringen av otillräckligt smält, koncentrerad mat från magsäcken till tarmarna.
6. Helicobacter pylori är en bakterie som finns hos patienter med sjukdomar i mage och tolvfingertarm.
7. Ketoacidosis är en uppsättning symtom som beror på ökad koncentration av ketonkroppar i blodplasman. Det är oftast förknippat med en komplikation av diabetes mellitus. Om störningar i kolhydratmetabolismen inte hanteras i tid utvecklas diabetisk ketoacidotisk koma.
8. Schwartz är sammanväxningar som bildas mellan lungsäcken och lungan till följd av trauma eller inflammation.
9. Katekolaminer är fysiologiskt aktiva substanser som fungerar som kemiska mellanhänder och "kontrollmolekyler" (mediatorer och neurohormoner) i intercellulära interaktioner i människan, bland annat i hjärnan. Katekolaminerna omfattar hormoner som adrenalin, noradrenalin och dopamin.
10. Nasalit är en nasal ton i rösten och ett förvrängt uttal av språkljud som orsakas av det ljudproducerande luftflödet i näs- och munhålorna.
11. Parkinsonism syndrom tillhör extrapyramidala syndrom. Det är en grupp motoriska störningar till följd av skador på de basala ganglierna och subkortikala talamiska anslutningar. Det manifesteras av fin tremor i händerna, allmän styvhet, som åtföljs av långsamma och dåliga rörelser, ansiktet blir maskliknande och uttrycker ibland en frusen grimas av överraskning eller sorg.

12. Glukokortikoider är hormoner som utsöndras av den mänskliga binjurebarken, de påverkar kolhydrat-, fett- och proteinmetabolismen, främjar glukosbildning och syntes av glykogen från proteiner i levern (glukoneogenes), hämmar biosyntesen av högmolekylära fettsyror. Brist på glukokortikoider sänker kroppens motståndskraft. De viktigaste glukokortikoiderna är hydrokortison (kortisol) och kortison.
13. Torpid (från latinets torpidus frusen, okänslig) är en term som används för att beteckna reaktioner och tillstånd i organismen som kännetecknas av ett trögt eller långsamt förlopp.
14. Mikrocirkulation är transport av biologiska vätskor på vävnadsnivå. Detta begrepp omfattar kapillärcirkulation (blodets rörelse genom kapillära mikrokärl), cirkulation av interstitiell vätska och substanser genom intercellulära utrymmen samt lymfflöde genom lymfatiska mikrokärl. Helheten av alla kärl som tillhandahåller mikrocirkulation kallas mikrocirkulationsbädd och inkluderar kapillärer, venoler, arterioler, arteriolenulära anastomoser, lymfatiska kapillärer. Mikrocirkulationens huvudfunktion är transport av blodkroppar och ämnen till och från . Dessutom är mikrocirkulationen involverad i termoregleringsprocesser, bildning av färg och konsistens i vävnader.
15. Adnexit är en inflammation i livmoderns bihang (äggledare och äggstockar).
16. Dysghormonella störningar är störningar i den normala balansen mellan könshormoner. Det är en av de vanligaste patologierna i reproduktionssystemet. Manifestationerna av dysghormonella störningar är : hos unga kvinnor är de oftare cykelstörningar, infertilitet, graviditetsfel, hos äldre kvinnor - livmodermyom, endometrios, kronisk bäckensmärta etc, hos män - sexuell svaghet, infertilitet.
17. Innervation - tillhandahållande av nerver.
18. Antiarytmisk effekt - förebygger och eliminerar rytmstörningar.
19. Den antianginösa effekten är en smärtlindrande .
20. Termogenes är kroppens förmåga att producera värme för att upprätthålla en konstant kroppstemperatur och göra det möjligt för alla dess system att fungera.
21. Blodreologi (från det grekiska ordet rhe'os - flöde, ström) är blodets fluiditet, som bestäms av kombinationen av det funktionella tillståndet hos blodbildande element (rörlighet, deformbarhet, aggregeringsaktivitet hos erythrocyter, leukocyter och blodplättar), blodets viskositet (koncentration av proteiner och lipider), blodets osmolaritet (koncentration av glukos).
- Varje sjukdomsförlopp åtföljs av funktionella och strukturella förändringar i en eller annan blodbildningarna. Detta gäller särskilt kardiovaskulära sjukdomar. Blodets viskositet är en av de viktigaste integrerande egenskaperna hos mikrocirkulationen och påverkar i hög grad de hemodynamiska parametrarna.
22. Chock (från engelsk - chock, chock) - en uppsättning störningar i hjärtaktivitet, andning och neuro-endokrin reglering som svar på extrem irritation. I huvudsak är det ett misslyckande med kompensationsreaktioner hos organismen som svar på skador, otillräcklig blodcirkulation.
23. Makrofager är celler i immunsystemet som aktivt kan fånga upp och smälta bakterier, rester av döda celler och andra främmande eller för kroppen giftiga partiklar.
24. DNA-replikation är processen för syntes av en dottermolekyl av deoxiribonukleinsyra på matrisen av den överordnade DNA-molekylen. Denna process säkerställer en korrekt överföring av genetisk information från generation till generation.

Människans Resurser AB

+46 8 334908

mail@mr-ab.se

www.mr-ab.se